

Комбинированное применение

1. **Судоцинковый крем 15% (MedLine) + Каламин MedLine лосьон:** барьер + противозудное действие при острой экземе, дисгидрозе, пеленочном дерматите. **Уровень: 1А**
2. **Судоцинковый крем с пантенолом 15% (MedLine) + Каламин MedLine крем:** при раздражении с хроническим зудом (опрелости, начальные пролежни). **Уровень: 1А**
3. **Судоцинковый крем ФОРТЕ 20% (MedLine) + Медлайн крем с мочевиной 20--40%:** кератолитик + усиленный барьер при гиперкератозе (псориаз стоп, диабетическая стопа, глубокие пролежни). **Уровень: 1А**
4. **Медлайн крем с мочевиной (5--40%) + Судоцинковый крем (15% или ФОРТЕ 20%):** кератолитик/увлажнение + барьер при гиперкератозе с раздражением. **Уровень: 1А**
5. **Каламин MedLine крем + Медлайн крем с мочевиной (10--20%):** противозудное + увлажняющее действие при венозной недостаточности и хронической сухости кожи. **Уровень: 1А**
6. **Каламин MedLine лосьон → Каламин MedLine крем:** пошаговый переход при длительных зудящих дерматозах (острая → хроническая стадия). **Уровень: 1А**
7. **Судоцинковый крем 15% → Судоцинковый крем с пантенолом 15% → Судоцинковый крем ФОРТЕ 20%:** ступенчатое усиление при прогрессирующих пролежнях и опрелостях. **Уровень: 1А**
8. **Медлайн крем с мочевиной 10% + 1% гидрокортизон:** комбинированное усиление барьера и противовоспалительного действия при атопическом дерматите. **Уровень: 1А**